

## 古い抗体しかできない！？ (抗原原罪)


免疫系が最初に出会った抗原の印象が記憶に残り、変異した抗原に対しても古い抗体を作ってしまうという可能性があります(抗原原罪)。ブースターで繰り返しワクチン接種をすることで、その抗原の印象がより増強してしまいます。

オミクロン株に対して効果的な抗体ができないばかりか、大量にできた武漢株抗体はかえって状況を悪化させる可能性があるのです(ADE = 抗体依存性感染増強)。



## 【世界はコロナ対策を中止】

ヨーロッパ諸国(特に北欧の国々)は、早くから自然感染で得られる免疫が一番であるという考えのもと、特別な感染対策を取りやめ、未だに行っているのは日本と中国だけなのです。




## 【打てば打つほど感染拡大】

3回目接種から日本での感染者数は爆発的に増加しています。



世界ではコロナワクチンを殆ど打つ人がいなくなり、それに伴い感染者数もあまり増加していません。

### オミクロン対応型接種者の体内でおきること



## 【2価ワクチンを打つことで 様々な可能性が懸念されている】

スパイクと抗体が数珠状につながって血栓形成してしまう(抗原抗体複合体の形成)。  
中和されないオミクロンスパイクによる細胞傷害(毒性の増大)。  
これ以外にも多くの懸念を指摘する専門家も数多くいます。



## 【日本だけが打っている？】

日本で使用されようとしているBA.1対応の2価ワクチンの感染予防効果は、ファイザー社のデータからほぼ期待できないことが示されています。

またBA.5対応の2価ワクチンも含めて海外では新型コロナワクチンを接種する人は減り続けており、日本だけが新型コロナワクチンを接種する状況になっています。

← 世界はワクチン接種をやめていっているのに、  
日本だけが接種し続けています!!

## 【55歳以下の臨床データは無い】

オミクロンBA.1対応の2価ワクチンの安全性に関して、ファイザー社が提出した資料から臨床試験は56歳以上を対象に約1200人、7日間だけで行っています。またBA.5対応2価ワクチンは人での臨床試験は行っていません。55歳以下の臨床データがないまま、12歳以上の年齢にオミクロン対応2価ワクチンの接種が行われているのです。

## 【免疫低下誘発！】

mRNA ワクチンが、免疫を低下させるという指摘がこれまで数多くされてきました。ワクチン接種後に免疫系の病気の発症や悪化が、世界のいたるところで報告されています。日本国内の学会でも報告が増えています。

このチラシの出典情報のまとめはこちら → <https://vmed.jp/vaccreferinfo/>

